

## NOG EVEN BALANUS BALANUS

In - een wat late - aansluiting op het artikel van Dr. Wolfgang Fr. Gutmann over de manieren waarop de zeepok zich op de ondergrond kan hechten, nog even een merkwaardigheidje, dat ik aantrof bij de symbiose tussen *Balanus Balanus* en een *Wulk*, *Buccinum Undatum*.

De zeepok had n.l. keurig de sculptuur van de *Wulk* overgenomen. Het kan een instinctieve poging tot mimicry geweest zijn, maar waarschijnlijker lijkt het, dat de basale plaat, en dus het hele dier de *Wulksculptuur* bezat zodat ook de opstaande platen de sculptuur overnamen. Ter volledigheid moet ik er echter aan toevoegen, dat andere zeepokken op *Wulken* de sculptuur niet of zeer flauw bezaten.

G.D. Majoor.

Noot v.d. redactie:

Het zal zeker wel een aanpassing zijn en geen mimicry, want zoiets vertonen immers de zeepokken (*Balanus balanoides*) op de stenen ook nooit. Hun pantsers weerhouden reeds vele vijanden.

=====

## IS HET MEYENDELSE SLAG IDEEAAL VOOR MALACOLOGEN ?

Het is U natuurlijk bekend dat bepaalde schelpensoorten uitsluitend in een beperkt gebied voorkomen. We denken hierbij b.v. aan de Stompe Alikruik (*Littorina littorea obtusata*) die aan de kust van Noord- en Zuidholland een zeldzaamheid is, doch elders (Zeeland en de Wadden) algemeen voorkomt.

Maar bij het doorbladeren van mijn kaartsysteem viel het me laatst op, dat vrij veel schelpen van mijn recente inlandse collectie van het Meyendelse Slag afkomstig zijn. Er werden naast vele algemene soorten o.a. de volgende minder algemene soorten verzameld (het nummer achter de naam geeft aan de bladzijde, waarop U de soort in "Schelpen vinden en herkennen" van Bob Entrop kunt aantreffen):

<i>Chlamys varia</i> , juveniel (85)	<i>Chlamys opercularis</i> , juveniel (87)
<i>Anomia squamula</i> , ook var. <i>Aculeata</i> (93)	
<i>Divaricella divaricata</i> (101)	<i>Lutraria lutraria</i> (128)
<i>Sphenia binghami</i> (151)	<i>Teredo megotara</i> (158)
<i>Patella vulgata</i> (180)	<i>Patella depressa</i> (181)
<i>Neptunea antiqua</i> (244)	<i>Buccium undatum</i> monstruositeit <i>sinistrorsa</i> (247)
<i>Acteon tornatilis</i> (254)	<i>Retusa alba</i> (266)

Hoewel de vondsten op zichzelf niet zoveel te betekenen hebben, is het opmerkelijk dat ze in de wintermaanden van + drie jaar verzameld werden. Het is echter zeer goed mogelijk dat een verzamelaar die b.v. in Bergen aan Zee woont ook met het grootste gemak zo'n lijstje samenstelt met dezelfde tijdslimiet.

Merkwaardiger is echter dat in deze periode nog nooit een parelmoerneut, *Nucula nucleus*, werd gevonden. Twee excursies naar het strand ten Zuiden van het Verversingskanaal leverden echter direct enkele - weliswaar beschadigde - exemplaren op. Een heerlijke toverbals voor de malacoloog en zeestromenkenner, waar wij met onze beperkte ervaring nog niet aan durven sabbelen!

Een feit is echter dat, zelfs in de zomer-toeristen-maanden het Meyendelse Slag vrij rustig is. In de winter is men er alleen met de vogels, de zee en...

de schelpen !

G.D. Majoor.

\*  
\* \*  
\*